

子どもの定期予防接種一覧

(令和5年4月1日現在)

予防接種名		接種回数	接種対象年齢	
ヒブ	標準	初回	3回 (間隔: 27日以上)	接種開始が 生後2か月～7か月 に至るまで(初回接種3回目を12か月に至るまでに行う)追加は初回終了後、7か月以上の間隔をおく(標準接種)
		追加	1回	追加は初回終了後、7か月以上の間隔をおく(標準接種)
	※注①	初回	2回 (間隔: 27日以上)	接種開始が 生後7か月～12か月 に至るまで(初回接種2回目を12か月に至るまでに行う)追加は初回終了後、7か月以上の間隔をおく
		追加	1回	追加は初回終了後、7か月以上の間隔をおく
		-	1回	初回接種が生後12か月～5歳に至るまで
	小児用肺炎球菌	標準	初回	3回 (間隔: 27日以上)
追加			1回	追加は初回終了後、60日以上の間隔をおき、12か月以降に接種(標準接種)
※注①		初回	2回 (間隔: 27日以上)	接種開始が 生後2か月～7か月 に至るまで(初回接種2回目を24か月に至るまでに行う)追加は初回終了後、60日以上の間隔をおき、12か月以降に接種
		追加	1回	追加は初回終了後、60日以上の間隔をおき、12か月以降に接種
		-	2回(間隔: 60日以上)	初回接種が生後12か月～24か月に至るまで
		-	1回	初回接種が生後24か月～5歳に至るまで
B型肝炎	-	3回	生後1歳に至るまで(なるべく生後2か月～8か月で接種)27日以上の間隔をおいて2回接種した後、1回目から139日以上おいて1回接種	
四種混合 (ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ)	1期初回	3回(間隔: 20日以上)	生後 2 か月～90か月に至るまで(なるべく1歳までに接種)	
	1期追加	1回	生後 2 か月～90か月に至るまで(なるべく1期初回終了後の12か月～18か月の間隔をおく)	
二種混合(ジフテリア・破傷風)		1回	11歳以上13歳未満(なるべく11歳で接種)	
BCG		1回	生後1歳に至るまで(なるべく生後5か月～7か月までに接種)	
MR(麻しん・風しん)	1期	1回	生後12か月～24か月に至るまで(なるべく1歳になったら早めに接種)	
	2期	1回	幼稚園・保育園の年長児に相当する年齢	
水痘(水ぼうそう)		2回(間隔: 3か月以上)	生後12か月～36か月に至るまで	
日本脳炎	1期初回	2回(間隔: 6日以上)	生後6か月～90か月に至るまで(なるべく3歳で接種)	
	1期追加	1回	生後6か月～90か月に至るまでの間で、1期初回終了後、6か月以上の間隔をおく(なるべく4歳で接種)	
	2期	1回	9歳以上13歳未満(なるべく9歳で接種)	

※注① 接種開始月齢によって接種回数異なります。

子宮頸がん予防HPワクチンについては専用ページをご確認ください。

粕屋地区内(古賀市・糟屋郡)から転入された方は、予診票は引き続きご使用できますが、粕屋地区外から転入された方は今後粕屋地区の予診票にて接種していただくこととなります。予診表は健康課(ヘルスC&Cセンター)に準備していますのでご連絡ください。